

نام و نام خانوادگی:
 مقطع و رشته: دهم انسانی
 نام پدر:
 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سؤال: ۱ صفحه

جمهوری اسلامی ایران
 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران



نام درس: ریاضی
 نام دبیر: آقای احتشامی
 تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
 ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

ردیف	سؤالات	محل مهر یا امضاء مدیر	نمره																												
۱	با استفاده از اتحاد، عبارت جبری زیر را تجزیه کنید.	$8y^3 - 1 =$	۱																												
۲	عبارت زیر را ساده کنید.	$\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9} =$	۱																												
۳	معادله‌های زیر را حل کنید.	الف) $(x - 3)^2 = 4$ ب) $9x^2 + 3x - 2 = 0$ ج) $\frac{x-2}{x-4} = \frac{x+1}{x+3}$	۰/۷۵ ۱/۲۵ ۱																												
۴	الف) تابع f به هر عدد حقیقی، دو برابر مکعب همان عدد، منهای ۴ را نسبت می‌دهد، ضابطه‌ی f را بنویسید و حاصل $f(3)$ را بیابید. ب) با توجه به ضابطه و دامنه‌ی تابع داده شده، برد تابع را به دست آورید.	$f(x) = x^3 + x + 1$ $D_f = \{0, -1, 2, -2\}$	۱																												
۵	مقادیر m و n را چنان بیابید تا در تابع با ضابطه‌ی $f(x) = mx + n$ داشته باشیم: $f(1) = 1$, $f(2) = 4$		۲																												
۶	نمودار سهمی به معادله $y = x^2 + 4x + 1$ را رسم کنید. مختصات رأس سهمی و محور تقارن آن را مشخص کنید.		۲																												
۷	آمارگیری را تعریف کنید و روش‌های جمع آوری داده‌ها را فقط نام ببرید.		۱/۵																												
۸	متغیر را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید، سپس نوع متغیرهای زیر را مشخص کنید. الف) گروه‌های خونی افراد ب) وزن دانش آموزان یک کلاس		۱/۵																												
۹	ابتدا میانگین داده‌های ۵، ۸، ۶، ۴ و ۲ را بیابید، سپس واریانس و انحراف معیار آن‌ها را به دست آورید.		۲/۵																												
۱۰	نمودار جعبه‌ای داده‌های مقابل را رسم کنید.	۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۳۰	۱/۵																												
۱۱	نمودار راداری جدول زیر را رسم کنید.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>افراد</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>درس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>۹۰</td> <td>۶۵</td> <td>درس ۱</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>۳۵</td> <td>۷۰</td> <td>درس ۲</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>۴۰</td> <td>۹۰</td> <td>درس ۳</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>۲۰</td> <td>۸۰</td> <td>درس ۴</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>۴۰</td> <td>۲۰</td> <td>درس ۵</td> </tr> <tr> <td>۶</td> <td>۵۰</td> <td>۶۰</td> <td>درس ۶</td> </tr> </tbody> </table>	افراد	A	B	درس	۱	۹۰	۶۵	درس ۱	۲	۳۵	۷۰	درس ۲	۳	۴۰	۹۰	درس ۳	۴	۲۰	۸۰	درس ۴	۵	۴۰	۲۰	درس ۵	۶	۵۰	۶۰	درس ۶	۲
افراد	A	B	درس																												
۱	۹۰	۶۵	درس ۱																												
۲	۳۵	۷۰	درس ۲																												
۳	۴۰	۹۰	درس ۳																												
۴	۲۰	۸۰	درس ۴																												
۵	۴۰	۲۰	درس ۵																												
۶	۵۰	۶۰	درس ۶																												



اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه/پسرانه سرکوش

کلید سؤالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نام درس: ریاضی



نام دبیر: آقای امتشامی

تاریخ امتحان: ۹۷/۰۳/۰۵

ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر								
۱	$8y^2 - 1 = (2y)^2 - 1 = (2y - 1)(4y^2 + 2y + 1)$									
۲	$\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9} = \frac{(x + 3)^2}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{x + 3}{x - 3}$									
۳	<p>A) $(x - 3)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5 \\ x - 3 = -2 \Rightarrow x = 1 \end{cases}$</p> <p>B) $9x^2 + 2x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = 9 + 72 = 81 > 0$</p> $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{81}}{18} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-2 + 9}{18} = \frac{1}{3} \\ x = \frac{-2 - 9}{18} = -\frac{2}{3} \end{cases}$ <p>C) $\frac{x - 2}{x - 4} = \frac{x + 1}{x + 3} \Rightarrow x^2 + x - 6 = x^2 - 3x - 4 \Rightarrow 4x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$</p>									
۴	<p>الف) $f(x) = 2x^2 - 4 \quad f(3) = 2 \times 3^2 - 4 = 54 - 50 = 4$</p> <p>ب) $f(0) = 1, f(-1) = 1, f(2) = 7, f(-2) = 3 \quad R_f = \{1, 7, 3\}$</p>									
۵	<p>$f(x) = mx + n$</p> <p>$f(1) = 1 \Rightarrow m \times 1 + n = 1$</p> <p>$f(2) = 4 \Rightarrow 2m + n = 4 \Rightarrow \text{حل دستگاه} \Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ n = -2 \end{cases}$</p>									
۶	<p>$y = x^2 + 4x + 1$</p> <p>$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2} = -2 \Rightarrow y = 4 - 8 + 1 = -3$</p> <p>مختصات رأس: $S(-2, -3)$</p> <p>محور تقارن: $x = -2$</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>-4</td> <td>-2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>1</td> <td>-3</td> <td>1</td> </tr> </table>	x	-4	-2	0	y	1	-3	1	
x	-4	-2	0							
y	1	-3	1							
۷	<p>گردآوری داده‌ها به یکی از روش‌های ممکن را آمارگیری می‌نامند.</p> <p>۱- مشاهده، ۲- پرسش‌نامه، ۳- مصاحبه، ۴- دادگان</p>									
۸	<p>هر ویژگی از اشخاص یا اشیاء که قرار است بررسی شود را متغیر می‌نامند.</p> <p>انواع آن: ۱- متغیر کمی ۲- متغیر کیفی</p> <p>الف) متغیر کیفی اسمی ب) متغیر کمی نسبی</p>									
۹	<p>$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 5}{5} = \frac{25}{5} = 5$ میانگین</p> <p>$S^2 = \frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 + (5-5)^2}{5} = \frac{9 + 1 + 1 + 9}{5} = 4$ واریانس</p> <p>$S = \sqrt{4} = 2$ انحراف معیار</p>									

<p>کوچکترین داده $a = 3$</p> <p>میانۀ $x = 10$</p> <p>چارک اول $Q_1 = 6$</p> <p>چارک سوم $Q_3 = 13$</p> <p>بزرگترین داده $b = 30$</p>	<p>۱۰</p> 	
<p>$\alpha = \frac{360}{6} = 60^\circ$</p>	<p>۱۱</p> <p>جدول دارای ۶ متغیر می باشد، لذا زوایه‌ی بین پره‌ها $\alpha = 60^\circ$ می باشد.</p> <p>هر پره را به ۱۰ قسمت تقسیم می نماییم.</p> 	
<p>امضاء:</p>	<p>نام و نام خانوادگی مصحح : داود احتشامی</p>	<p>جمع بارم : ۲۰</p>